

Ghid de analiză foliară

Previzualizare — extras din documentul integral

05 septembrie 2026

Document EDTA Plant · metodologie agronomică

CLIENT / BENEFICIAR

Căpșun

Fragaria × ananassa · Fructe de pădure

DETALII ANALIZĂ

Data generării

05 septembrie 2026

Versiune document

v1.0

DESPRE ACEST RAPORT

Raportul separă valorile analitice furnizate, interpretarea față de referințele interne EDTA Plant și recomandările agronomice orientative. Statutul surselor și limitările metodologice sunt prezentate în document.

CONSULTANȚĂ

0729 857 947

SUPPORT TEHNIC

0723 595 983

EMAIL · WEB

office@edtaplant.ro · edtaplant.ro

STRUCTURA DOCUMENTULUI

Documentul este structurat pe identitatea culturii, protocolul de prelevare, fenologie, intervale nutriționale documentate, fiziologia elementelor și sursele aferente. Fiecare secțiune poate fi accesată direct prin bookmark-urile PDF.

- | | |
|--|---|
| 1. Prezentare generală ... | 4. Fenofaze de referință (scala BBCH) ... |
| 2. Valori orientative (interval optim general) ... | 5. Surse ... |
| 3. Simptome de carență și impact asupra producției ... | |

CUM SE UTILIZEAZĂ DOCUMENTUL

● Domeniu de aplicare

Informația este legată de cultura, organul și fereastra fenologică indicate; nu se transferă automat între specii.

🕒 Intervale documentate

Pragurile numerice sunt afișate numai împreună cu unitatea, baza de exprimare și sursa care le susține.

▲ Decizie agronomică

Simptomele vizuale sunt orientative. Confirmarea se face prin analize de țesut, sol sau apă și prin contextul parcelei.

○ Trasabilitate

Sursele sunt enumerate la final și pot fi urmărite din secțiunile tehnice ale documentului.

Cuprinsul reflectă documentul integral. Această previzualizare conține doar un extras.

Prezentare generală

Denumire științifică	Fragaria × ananassa
Grup	Fructe de pădure
Organ analizat	frunza cea mai tânără complet formată (limb + petiol), la începutul înfloririi
Perioada de recoltare	la începutul înfloririi, frunza cea mai tânără complet formată

Analiza foliară la Căpșun (Fragaria × ananassa) evaluează starea reală de nutriție a plantei prin prelevarea din frunza cea mai tânără complet formată (limb + petiol), la începutul înfloririi. Recoltarea se face la începutul înfloririi, frunza cea mai tânără complet formată. Valorile orientative de mai jos reprezintă intervalul intern de referință la maturitate vegetativă mijlocie. Tabelul complet pe toate fenofazele (scala BBCH), statutul de provenance și metodologia declarată sunt disponibile în secțiunea pentru clienți.



Accesul complet la acest document este disponibil doar în varianta integrală.

Acesta reprezintă un material tehnic profesional elaborat de echipa EDTA Plant și conține informații complete privind metodologia, interpretarea rezultatelor, recomandările tehnice și valorile de referință.

Versiunea completă poate fi achiziționată online, direct de pe edtaplant.ro – acces instantaneu după confirmarea plății.

Consultanță · Nutriția plantelor 0729 857 947 · Suport tehnic 0723 595 983 · edtaplant.ro/contact