

Ghid de analiză foliară Căpșun

Fragaria × ananassa · Fructe de pădure

Previzualizare — extras din documentul integral

Data generării: 22 iulie 2026

Versiune document: 1.0

Sursă: standardele partajate EDTA (aceleași valori ca în portal și pe edtaplant.ro).

Consultanță · Nutriția plantelor 0729 857 947 · Suport tehnic 0723 595 983

Cuprins

1. Prezentare generală
2. Valori orientative (interval optim general)
3. Simptome de carență și impact asupra producției
4. Fenofaze de referință (scala BBCH)
5. Surse

Cuprinsul reflectă documentul integral. Această previzualizare conține doar un extras — secțiunile complete sunt disponibile în varianta integrală.

Prezentare generală

Denumire științifică

Fragaria × ananassa

Grup

Fructe de pădure

Organ analizat

frunza cea mai tânără complet formată (limb + petiol), la începutul înfloririi

Perioada de recoltare

la începutul înfloririi, frunza cea mai tânără complet formată

Analiza foliară la Căpșun (Fragaria × ananassa) evaluează starea reală de nutriție a plantei prin prelevarea din frunza cea mai tânără complet formată (limb + petiol), la începutul înfloririi. Recoltarea se face la începutul înfloririi, frunza cea mai tânără complet formată. Valorile orientative de mai jos reprezintă intervalul optim general la maturitate vegetativă mijlocie. Tabelul complet pe toate fenofazele (scala BBCH), pragurile exacte și metodologia de laborator sunt disponibile în secțiunea pentru clienți.



Accesul complet la acest document este disponibil doar în varianta integrală.

Acesta reprezintă un material tehnic profesional elaborat de echipa EDTA Plant și conține informații complete privind metodologia, interpretarea rezultatelor, recomandările tehnice și valorile de referință.

□ **Pentru achiziționarea versiunii complete a documentului, vă rugăm să contactați echipa EDTA Plant.**

Consultanță · Nutriția plantelor 0729 857 947 · Suport tehnic 0723 595 983 · edtaplant.ro/contact